

# جدول التطعيم - حماية مدى الحياة

يجب أن يبدأ التطعيم في وقت مبكر من حياة الرضيع ويمكن أن يستمر بشكل منتظم حتى سن المراهقة. إذا كان طفلك يعاني من حساسية للبيض ، يرجى استشارة طبيب الأطفال.

العمر الموصى به	اللقاح
عند الولادة	اللقاح ضد السل (بي سي جي)
عمر شهرين	شلل أطفال (اي بي في) والثلاثي والتهاب الكبد ، والسداسي (١) والمكورات الرئوية - ١٣ (٢) وفيروس الروتا (١)
٤ شهور	شلل الأطفال (اي بي في) والثلاثي والتهاب الكبد ، السداسي (١) والمكورات الرئوية - ١٣ (٢) وفيروس الروتا (٢)
٦ شهور	شلل الأطفال (اي بي في) والثلاثي والتهاب الكبد ، السداسي (٣) وشلل الأطفال بالفم (١) والمكورات الرئوية ١٣ (٣) وروتا فيروس (٣) ان لزم ، استشر طبيب الأطفال
٩ شهور	الحصبة (أحادي) والمكورات السحائية ١
١٢ شهرا	شلل اطفال بالفم (٢) حصبة ونكاف وحصبة المانية # ١ جدري الماء المكورات الرئوية - ١٣ (٤) المكورات السحائية - ١٣ (٢)
١٨ شهرا	شلل اطفال بالفم (٣) الثلاثي / دي تي بي / هب ٤ التهاب الكبد A (١) حصبة ونكاف وحصبة المانية # ٢
٢٤ شهرا	التهاب كبد A (٢)
٤-٦ سنوات	شلل اطفال بالفم (٤) الثلاثي ٥ جدري الماء (٢) حصبة ونكاف وحصبة المانية # ٣
١١-١٢ سنة	لثي المكورات السحائية ٣
١٦-١٨ سنة	المكورات السحائية ٤
الكبار	تيتانوس ودفتريرا كل ١٠ سنوات

يوصى بالتطعيم ضد الانفلونزا سنويا لجميع الكبار والأطفال من عمر ٦ شهور واكبر

# Vaccination Schedule – A Lifetime of Protection

Vaccinations should begin early in an infant’s life and continue on a regular basis to adolescence. If your infant is allergic to eggs, please consult your pediatrician.

Recommended Age	VACCINE
Birth	BCG HepB (1)
2 months	IPV – DtaP-HepB-Hib, Hexavalent (1) Pneumococcal conjugate – 13 (1) Rotavirus (1)
4 months	IPV – DtaP-HepB-Hib, Hexavalent (2) Pneumococcal conjugate – 13 (2) Rotavirus (2)
6 months	IPV – DtaP-HepB-Hib, Hexavalent (3) OPV (1) Pneumococcal conjugate – 13 (3) Rotavirus (3) if required, consult your pediatrician
9 months	Measles (monovalent) Meningococcal conjugate (1)
12 months	OPV (2) MMR#1 Varicella Pneumococcal conjugate – 13 (4) Meningococcal conjugate – 13 (2)
18 months	OPV (3) DTaP/Hib or DTP/Hib (4) Hep A (1) MMR#2
24 months	Hep A (2)
4 – 6 years	OPV (4) DTaPd (5) Varicella (2) MMR#3
11 – 12 years	Tdap Meningococcal conjugate (3)
16 – 18 years	Meningococcal conjugate (4)
Adults	Tdap booster every 10 years

*Annual influenza vaccination recommended for all adults and children aged 6 months and older.*